

Boehringer Ingelheim НексГард - інсекто-акарицидний засіб у вигляді таблеток для жування, що застосовуються для профілактики та лікування собак масою тіла 10-25 кг при ураженнях ектопаразитами, а також для профілактики ураження кліщами.

Призначення:

Профілактика та лікування собак при ураженнях кліщами (*Dermacentor variabilis*, *D. reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *I. scapularis*, *I. hexagonus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum* та *Haemaphysalis longicornis*) та блохами (*Ctenocephalides felis* та *C. canis*).

Препарат можуть застосовувати, як один із засобів, при лікуванні блошиного алергічного дерматиту собак:

- о Лікування демодекозу (спричиненого *Demodex canis*).
- о Лікування саркоптозу (спричиненого *Sarcoptes scabiei* var. *canis*).
- о Лікування отодектозу (спричиненого *Otodectes cynotis*).

Механізм дії:

Афоксоланер належить до сполук ізоксазолінового класу, його дія полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Така дія характерна лише для безхребетних і безпечна для ссавців. Зв'язування рецептора відрізняється від дії інших комерціалізованих ГАМКХІ інсектицидів, знижуючи можливість перехресної резистентності.

Афоксоланер активно діє на імагінальні стадії бліх (*Ctenocephalides felis* та *Ctenocephalides canis*) та кліщів (*Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Ixodes scapularis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Amblyomma americanum* і *Haemaphysalis longicornis*).

Афоксоланер вбиває бліх перед тим, як вони відкладуть яйця.

Дія препарату НексГард на ектопаразити починається вже через 4 години після застосування і досягає майже 100 % ефективності через 8 годин. Препарат запобігає повторним зараженням блохами і кліщами впродовж одного місяця.

Після перорального застосування препарату собакам, афоксоланер швидко всмоктується і поширюється в організмі тварини.

Чому варто придбати?

- о Собака із задоволенням з'їсть смачну таблетку, що нагадує за смаком її улюблені ласощі
- о Простота застосування дає можливість без особливих зусиль захистити Вашого улюбленця від паразитів
- о Можна використовувати для собак зі шкірними захворюваннями і свербінням, на відміну від інших зовнішніх засобів
- о Забезпечує гарантований результат, препарат пройшов перелік необхідних досліджень і тестів
- о Швидко всмоктується в кров і починає вже діяти через 30 хвилин після застосування. Вбиває бліх перш, ніж вони встигли відкласти яйця, запобігаючи тим самим зараження будинку
- о Одноразове застосування забезпечує ефективну концентрацію препарату протягом 4-х тижнів
- о Для використання препарату не потрібна особлива підготовка або голодна дієта
- о Безпечний, добре переноситься організмом собак, не викликає побічних реакцій, навіть при значних перевищеннях дозування
- о Не має тератогенних, ембріотоксичних або мутагенних властивостей. Якщо є така необхідність, то можна застосовувати препарат вагітним і лактуючим собакам під контролем ветеринарного лікаря.

Як використовувати

- о Препарат застосовують собакам перорально з кормом або примусово у дозі 2,7–6,9 мг/кг маси тіла тварини
- о Для собак, масою тіла понад 50 кг, використовують комбінацію таблеток різної/однакової концентрації.
- о Застосування препарату для обробки собак проти бліх та кліщів рекомендують проводити 1 раз на 4 тижні, залежно від епізоотичної ситуації.
- о При лікуванні демодекозу препарат застосовують щомісяця до отримання двох негативних зіскобів шкіри з різницею в один місяць. При більш тяжких випадках захворювання лікування препаратом може бути подовжено. Оскільки демодекоз є мультифакторним захворюванням, рекомендується провести відповідне лікування інших наявних захворювань, якщо це є можливим.
- о При лікуванні саркоптозу препарат застосовують раз на місяць протягом двох місяців. Подальше використання препарату має базуватися на клінічній оцінці та результатах шкірних зіскобів.
- о Лікування отодектозу: одноразове застосування препарату. Може бути призначено повторне застосування препарату через місяць після першого прийому базуючись на результатах клінічної оцінки.

Протипоказання

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати тваринам із відомою гіперчутливістю до одного з компонентів!

Особливі застереження при використанні

Застосування препарату тваринам віком до 8 тижнів та/або масою тіла до 2 кг ґрунтується на оцінці можливих ризиків.

Використання під час вагітності, лактації

Можливість застосування препарату під час вагітності та лактації визначає лікар ветеринарної медицини із врахуванням можливих ризиків.